

Amazon Prime Big Deal Days
10-11 October

amazon prime
Shop now >
Included with a Prime membership

SINGAPURA

Mereka yang tidak divaksin hadapi risiko lebih tinggi masalah jantung selepas pulih daripada COVID

Anggaran Waktu Membaca: 1 min



Diterbitkan : 09 Oct 2023 06:53PM | Dikemas Kini : 09 Oct 2023 09:10PM

Aa

SINGAPURA: Sebuah kajian menunjukkan bahawa para pesakit yang pulih daripada COVID-19 namun tidak pernah divaksin, menghadapi risiko lebih tinggi menghadapi masalah jantung.

Kajian yang dijalankan oleh Universiti Teknologi Nanyang (NTU) itu mendedahkan bahawa mereka menghadapi risiko 56 peratus lebih tinggi.



Masalah jantung berkenaan termasuk kegagalan jantung, serangan angin ahmar serta darah beku, setahun selepas dijangkiti COVID-19.

Kajian itu menggunakan rekod kesihatan daripada 106,000 penduduk Singapura yang dijangkiti COVID-19 antara September hingga November 2021.

Lebih 900 pesakit yang pulih masih mengalami kesan sampingan berpanjangan seperti lelah dan sesak nafas.

Lebih 300 yang tidak mendapatkan vaksin mengalami degupan jantung yang tidak normal selepas setahun.

Pesakit yang mendapatkan suntikan vaksin sebelum dijangkiti menghadapi risiko lebih rendah, iaitu 11 peratus.

IKLAN



Mereka yang mendapatkan suntikan tambahan menghadapi risiko yang sama dengan mereka yang tidak pernah dijangkiti.

Kajian ini merupakan yang pertama dan yang terbesar yang mengkaji kesan jangka panjang COVID-19 di Asia Tenggara.

Sumber : CNA/AT/at